

زراعة الخضار

المصدر: المفكرة الزراعية - الطبعة الرابعة ١٤٢٠

تقسيم الخضار حسب موسم الزراعة ودرجة تحملها للحرارة والبرودة

الخضار الصيفية		الخضار الشتوية	
يناسبها الجو الحار	تحتمل البرودة ونفضل الجو المعتدل	لاتتحمل الصقيع	تحتمل الصقيع
بادنجان	طماطم	بطاطس	باذلاء
بامية	فاصوليا	ثوم	بصل
بطيخ	قلقصاس	جزر	جرجير
خيار		خبازي	سبانخ
شمام		خرشوف	كرنب (ملفوظ)
قرع عسل		سلق	لفت
كوسا		بقدونس	البنجر
رجلة		خس	الفجل
لوبية		فول رومي	
ملوخية		قرنبيط (زهرة)	
		كرفس	



مواعيد زراعة الخضار

الاسم	موعد زراعة البذور	الاسم	موعد زراعة البذور	الاسم	موعد زراعة البذور
فبراير - أبريل ويمكن التبكيـر في المناطق الدافـة حيث تزرع في يناير وهي أكتـوبر ونوفمبر في السواحل الدافـة مثل الشمام والقاون	القاون	أغسطس - فبراير	أغسطس - فبراير	جريـر	الصيفـية المـبكرة -
فبراير - مايو ويزرع في أكتـوبر ونوفمبر في المناطق الساحـلية الدافـة مارس وأبريل	الخـيار	سبتمبر - فبراير	سبتمبر - فبراير	البنـجر	اكتـوبر ونوفمبر
فبراير - مايو ويزرع في أكتـوبر ونوفمبر في المناطق الساحـلية الدافـة مارس وأبريل	القرع العـسلـي	سبتمبر - فبراير	سبتمبر - فبراير	السبـاخ	الصيفـية المـتأخرـة -
فبراير - فبراير	(الدبـة)	سبتمبر /يناير	سبتمبر /يناير	السلـق	فبراير
فبراير - فبراير	الكـوسـا	مارس - أبريل	يناير - ماـيو	اللوبـيا	سبتمبر - نـوفـمبر
فبراير - فبراير	البـاميـا	المنـاطـق الدافـة	اكـتوـبر ونـوفـمبر في الجـزـر الـيـمـانـي	الحـبـب	سبتمبر - نـوفـمبر
يناير - في السـواـحل الدافـة (صيفـي مـبـكرـ)		فبراير - أـبرـيل ويمـكن	يناير - فـبراـير	الشـام	سبتمبر - أكتـوبر
فبراير - مارس - أـبرـيل (صيفـي مـتأـخرـ)		التبـكـير في المناطق الدافـة حيث تزرع في يولـيـه - أغـسـطـس (خـريـفي)	يزـعـ في أكتـوبر	الداـفـة	أغـسـطـس - فـبراـير
يناـيرـ في السـواـحل الدافـة مارـس - أـبرـيل (يمـكن أن تزرـع طـوالـ السـنة مـاعـدـ الأـشـهـرـ الـبارـدةـ)	المـلوـخـية	ونـوفـمبرـ في المناطق السـاحـلـيةـ الدـافـةـ	ونـوفـمبرـ في المناطق	الـرـجـلـة	أغـسـطـس - فـبراـير
فبراير - سـبـتمـبرـ					طـماـطـمـ
					الـبـاذـنجـانـ
					الـفـاضـلـ
					الـبـصـلـ
					الـكـرـنـبـ
					الـقـرـنـبـيطـ
					الـخـسـ
					الـبـسـلةـ
					الـفـولـ
					الـثـوـمـ
					الـبـطـاطـسـ
					الـجـزـرـ
					الـلـفـتـ
					الـفـجلـ

طرق زراعة بذور الخضروات

بذور خضروات تزرع في الحقل على مشاعيب	بذور خضروات تزرع في الحقل في أحواض نثراً أو في سطور	بذور خضروات تزرع في الحكيرة لمدة شهر ونصف لزراعة شتلاتها في الحقل
طماطم باذنجان - شمام فلفل - فاصولياء كربب - فول قرنبيط - قاونون بصل - قثاء خس - دبه باميا - كوسا بسله - لوبايا بصل بطاطا حلوة (جزر يماني) بطاطس بطيخ (حبب) ثوم خس خيار	بقدونس بنجر جرجير جزر خبازي رجله سبانخ سلق فجل لفت ملوخية كرات	طماطم باذنجان فلفل كربب(ملصوف) قرنبيط(زهرة) بصل خس



كمية التقاوى الالزمه للدونم من الخضروات

كمية التقاوى	الإسم	كمية التقاوى	الإسم	كمية التقاوى	الإسم
٤٠٠-٢٠٠ جرام حسب موعد الزراعة	القاون	٧٠٠ - ٥٠٠ جرام حسب طريقة الزراعة	الجزر	٨٥ - ٧٥ جرام لإنتاج شتلات	طماطم
٤٠٠-٢٠٠ جرام حسب موعد الزراعة	الثاء	١٠٠٠ - ٦٠٠ جرام حسب طريقة الزراعة	اللفت	٢٥٠٠ - ١٥٠٠ جم لإنتاج شتلات	بازنجان
٥٠٠-٢٥٠ جرام حسب موعد الزراعة	الخيار	٢٠٠٠ - ١٠٠٠ جم حسب طريقة الزراعة	الفجل	١٥٠ - ٧٥ جم لإنتاج شتلات	فلفل
٢٠٠-١٢٥ جرام حسب موعد الزراعة	القرع (الدبة)	٣,٥ - ٢,٥ كيلو جرام	جريجير	٣٥٠٠ - ٢٥٠٠ شتلات	بصل
١,٥-١ كيلو جرام ٦-٥ آلاف عقلة تؤخذ من مساحة نصف دونم زراعية قديمة	الكوسا الجزر اليماني	١,٥ - ١ كيلو جرام	السبانخ	٥٠ - ٢٥ ألف شتلات	كرف
٥-٢ كيلو جرام حسب موعد الزراعة	البامية الملوخية	٢ - ١ كيلو جرام	البنجر	١٢٠ - ٩٠ جرام لإنتاج شتلات	القرنبيط
١٢-٨ كجم	الرجلة	٥٠٠ - ٤٠٠ جرام حسب موعد الزراعة	السلق	٤٠٠ - ٢٠٠ شتلات	الحس
		٢,٥ - ٢ كيلو جرام حسب الصنف وطريقة الزراعة	الخبيزي	٩٠ - ٦٠ جرام لإنتاج شتلات	
		٦ - ٢ كيلو جرام حسب الصنف	فاصوليا	٣٠٠ - ٢٠٠ شتلات	
		٥٠٠ - ٢٥٠ جرام حسب موعد الزراعة	البطيخ (الحبب)	١٢ - ٨ كيلو جرام حسب الصنف وطريقة الزراعة	الفول الرومي
		٤٠٠ - ٢٠٠ جرام حسب موعد الزراعة	الشمام	١٨ - ١٢ كيلو جرام حسب الصنف من الفصوص تنتج من ٧٠ - ٥٠ كجم من الثوم بعروشه	الثوم
				٢٥٠ - ٢٠٠ كجم من الدرنات حسب الزراعة وحجم الدرنات.	البطاطس

المدة التي تحتفظ فيها بعض بذور الخضار بحيويتها

بصل - بقدونس - قرع عسلی (دبة)	سنة
بامية - شمندر (بنجر) - ملوخية	سنتان
جزر - سلق - سبانخ - بازيلاء - فاصولياء - لوبیاء - طماطم - فلفل	ثلاث سنوات
كرنب (ملفووف) - قرنبيط (زهرة) - فجل - لفت - خس - فول	أربع سنوات
خيار - شمام - بطيخ - كوسا - قرع الكوسا	خمس سنوات



تقسيم محاصيل الخضار حسب درجة إجهادها للتربة

بازنجان - طماطم - فلفل - بطاطس - بامية - جزر - قرنبيط - ملفوف - بطاطا - قرع عسلی - قلقاس - خرشوف - طرطوفه	محاصيل الخضار المجهدة
بقدونس - كرفس - سبانخ - بنجر - سلق - بصل - ثوم - كرات - فجل - لفت - بطيخ - شمام - خيار - قثاء - قرع كوسا.	محاصيل الخضار نصف المجهدة
فاصولياء - لوبیاء - بازلاء - فول رومي	محاصيل الخضار غير المجهدة (المريحة)

معدلات عامة مقترحة لتسميد بعض محاصيل الخضروات *

المحصول	يوريا (كجم للدونم) توزع على عدة دفعات	فوسفات الأمونيوم الثنائية (كجم للدونم) مع الزراعة	سلطات بوتاسيوم (كجم للدونم) مع الزراعة أو على دفعتين
باذنجان	٢٠	٢٠	١٠
بصل وثوم	٢٥	٢٠	١٥
بطاطس	٤٠	٣٠	٢٠
بقويليات خضراء (فاصولياء، فول، بسلة، لوبية)	٢٠	٢٥	٢٠
بنجر	٤٠	٤٠	١٥
جزر	٤٥	٣٠	١٧
طماطم	٣٠	٢٥	١٠
فلطل	٤٠	٢٨	١٧
قرعيات (بطيخ، خيار، شمام، كوسا)	٤٠	٣٠	٢٥
كرنب	٤٠	٣٠	٢٥
خضار ورقية	٤٠	٤٠	١٥

ملاحظات :

- هذه معدلات عامة وتبسيطية للشجرة قابلة للزيادة والنقص حسب خصوبة التربة وقوامها وظروف البيئة المحيطة والصنف.
- فوسفات الأمونيوم الثنائية . (داب)
- العناصر الصغرى تضاف حسب نقصها في التربة ونوع المحصول. واليوريا يضاف للبقويليات في حالة عدم إضافة البكتيريا العقدية.