

برلكس سائل

مركز سائل

التركيب: كل لتر يحتوي على ٤٠ غم Gibberellic acid

برلكس منظم نمو بصورة سائلة لزيادة حجم حبات العنب وللاستعمال بالارضي شوكي والحمضيات. برلكس سائل يحتوي على هرمون النمو حامض الجبريلين، هذا الهرمون يعمل بتراكيز قليلة ويؤثر على اجزاء النبتة الظاهرة والداخلية
ملاحظة:
يجب ان يكون استعمال محلول الرش محاذاً لتحضير محلول الرش وممنوع ابقاء محلول الرش حتى يوم غد، قم بتحضير محلول الرش محاذاً لموعد الرش.

تعليمات الاستعمال:

المحصول	الهدف	موعد المعاملة	تركيز جزء للمليون ppm	كمية (سم ٣) لكل ١٠٠ لتر ماء	حجم محلول الرش
عنب (١): سولطانيا، برليط	زيادة حجم حبات العنب (للتفريد استعمل الاقراص)	١- الرش الاول تكون عند انتهاء العقد	٣٠	٧٥	تغطية جيدة بحجم رش ١٥٠-٢٠٠ لتر ماء فقط
		٢- الرش الثانية بعد ٥-٧ ايام من الرش الاول	٣٦	٩٠	
		٣- الرش الثالثة بعد ٥-٧ ايام من الرش الثانية	٤٠	١٠٠	
		٤- الرش الرابعة بعد ٥-٧ ايام من الرش الثالثة	٤٠	٩٠	
ارضي شوكي: (٢) بنفسجي مبكر	تبكير الانتاج	رشتان: الاولى بداية تشرين اول والثانية بعد ٢١ يوم من الرش الاولى	٣٠-٤٠	٧٥-١٠٠	تغطية جيدة حجم محلول الرش يكون حسب اللازم الرش بعد الري
ارضي شوكي اخضر	تبكير الانتاج	ثلاث رشات: (١) ٥-١٠ ايلول (٢) ٢٠ يوم بعد الرش الاولى (٣) ٢٠ يوم بعد الرش الثانية	١٢٠	٣٠٠	تغطية جيدة حجم محلول الرش يكون حسب اللازم الرش بعد الري

التكملة في الصفحة التالية



المحصول	الهدف	موعد المعاملة	تركيز جزء للمليون (PPM)	كمية (سم ³) لكل ١٠٠م لتر ماء	حجم محلول الرش
حمضيات (٣) : نوفا	منع انهيار الثمار وتطويل موسم القطف	منتصف تشرين اول قبل تغير لون الثمار (رشة واحدة)	٥	١٢,٥	١٠ لتر للشجرة
	زيادة المحصول	قمة الازهار (منتصف نيسان)	٥٠-٢٥	١٢,٥-٦٢,٥	١٠ لتر للشجرة
ميخال	منع انهيار الثمار واطالة موسم القطف	منتصف تشرين اول قبل بداية التلون (رشة واحدة)	٥	١٢,٥	١٠ لتر للشجرة
	زيادة العقد	الرشة بقمة الازهار	٢٥	٦٢,٥	١٠ لتر للشجرة
قالينسا	تقليص التجعد	تموز	٢٠	٥٠	١٠ لتر للشجرة
جرايفروت ابيض واحمر	تأخير نضوج الثمار ببيوت التعبئة	مخلوط مع دونج بجهاز التعبئة	٥٠	٢٥٠ سم ^٣ لكل ٢٠٠ لتر دونج	
افرسمون: طريومف	تقليل تساقط العقد	قمة الازهار	٣٠	طريون X ١٠٠ بتركيز ٠,٠٢٥ %	حتى التنقيط
	اطالة موسم القطف وحيوية الثمار بالتخزين	نهاية تشرين اول بداية تشرين ثاني	٥٠	١٢٥	

- (١) في العنب: يجب اضافة مادة ناثرة ناثرة طريون X ١٠٠ بتركيز ٠,٠٢٥ % (٢٥ سم^٣ لكل ١٠٠ لتر ماء)
- (٢) ارضي شوكي: ممنوع رش قطع غير ممتازة بتطورها وملوثة بالاعشاب البرية
هام: هذه المعاملة تكمل معاملات موصى بها لنفس الهدف.
- (٣) في الحمضيات: اضافة مواد ناثرة مثل نوطركس ٠,٠٥ % او L-77 ٠,٠٥ %

قابلية الخط:

يجب الالتزام بجميع التعليمات المدونة على المستحضر المخلوط.

بالعنب: (فقط لزيادة حجم حبات العنب) من اجل استيعاب جيد للهرمون ممكن ان نزيد من حامضية المحلول
باضافية اوريا فوسفات(UP50) من شركة دشنيم بتركيز ٠,٢ % (٢٠٠ سم^٣ لكل ١٠٠ لتر ماء) وايضاً يمكن
الخلط مع سيسيتان بتركيز ٠,٢ %.

ممنوع الخلط مع مستحضرات اخرى دون استشارة مرشدي مختشيم



انتاج وتسويق شركة مختشيم معامل كيماوية م.ض
رقم رخصة قسم وقاية النباتات ٩٢/هـ/ص ١١٨٢

العبوات المتوفرة: ١ لتر

درجة السمية - III

غير سام لذوي الدم الحار، الاسماك والنحل



قبل الاستعمال اقرأ وتتمعن وتقيّد بالتعليمات المدونة على لاصقة العبوة.