

كولتار 25

مركز معلق

التركيب: كل لتر يحتوي على 250 غم على Paclobutrazol

كولتار 25 مركز معلق لتنظيم النمو وتحسين العقد بمحصول ابوكادو من صنف فاويرتا. كولتار منظم نمو جهازى يعمل على عرقلة انتاج هورمون جبريلين. عند رشه على النمو الخضري يستوعب بالاساس عن طريق السيقان الخضراء واطراف النمو وايضاً يستوعب عن طريق الجذور. كولتار يؤدي الي تطور نمو خضري كثيف اكثر ويمكن ان يزيد الازهار والعقد. ملاحظات:

كولتار يعمل كمنظم نمو، للمستحضر يوجد فعالية متبقية بالتربة وذلك لانه يستوعب عن طريق الجذور ولذلك ممنوع رش كولتار ثلاث سنوات قبل خلع قطعة، من اجل منع توقف النمو في المحصول المزروع يوصى بعد الخلع ان نزرع محاصيل حقلية ليست عريضة الاوراق وفي السنتين الاوليتين يوصى باستعمال كولتار بقطع قليلة الانتاج ولكن ممنوع رشه على اشجار قليلة الحيوية او على اشجار تعاني من ضيق. ممنوع رش كولتار عندما تكون رياح لثلا يصل الرذاذ الى محاصيل مجاورة.

تعليمات الاستعمال:

المحصول	الكمية		مادة نائرة	معدل المعالجة
	شدة النمو	تركيز		
ابوكادو من صنف فاويرتا من جيل 5 سنوات وفوق	اشجار بنمو موسمي متوسط بين 20-30 سم	0,75% - 1%	L-77 طبولين او شطاح 90 بتركيز 0,1%	معالجة واحدة في الموسم وذلك من الفترة التي تصل بها اعناق الازهار لطول 5 سم وحتى ظهور الزهرة الاولى، والفحص يكون بالجهة الجنوبية للشجرة بارتفاع 2 م ممنوع الرش وقت الازهار الكامل
في اشجار ابوكادو مركبة من جيل 5 سنوات وفوق	اشجار بنمو موسمي متوسط بين 50-45 سم	1% - 1,5%		

قابلية الخلط:

يجب الالتزام بجميع التعليمات المدونة على المبيد المخلوط. ممنوع خلط كولتار مع مبيدات كيميائية اخرى (ما عدا L-77، طبولين، شطاح 90) ممنوع خلطه مع مستحضرات اخرى دون استشارة مرشدي مختشيم.

غير مصنف

انتاج Syngenta سويسرا

تسويق شركة مختشيم معامل كيميائية م.ض

رقم رخصة قسم وقاية النباتات 88/هـ ص/964

العبوات المتوفرة: لتر

درجة السمية - IV

سام للاسماك



قبل الاستعمال اقرأ بتمعن وتفيد بالتعليمات المدونة على لاصقة العبوة.