# بسم الله الرحمن الرحيم

# Sasso performance guide (Elwafaa farm)




### إضافات الأعلاف

يراعى اضافة سمسم فى الايام الثلاثة الاولى بالرش على اعلاف العلف بمعدل ١ : ٥٠ كلجم فى اليوم لكل ١٠٠٠ كتكوت.

| البيـــــــان | من عمر ١ - ٢٠ يوم | من عمر ٢١ - ٤٥ يوم | من عمر ٤٦ يوم الى الذبح |
|---|---|---|---|
| مضاد كلوستريديا وسالمونيلا وأى كلولاى | ✓ | — | ✓ |
| مضاد كلوكسيديا | ✓ | ✓ | — |
| مضاد سموم | ✓ | ✓ | ✓ |

يفضل تغيير نوع مضاد الكلوكسيديا المضاف على العلف أثناء

### اللقاحات

| العمر بالأيوم | نوع التحصين | طريقة التحصين |
|---|---|---|
| ٧ | كلونين - التهاب شعبى | ماء الشرب بمعدل ١,٢٥ جرعة |
| ١٠ | نيوكاسل ميت تسمين - انفلونزا | حقن ٠,٢ سم / كتكوت تحت الجلد |
| ١٥ | جمبورو (مثيرة شديدة أو متوسطه) | ماء الشرب بمعدل ١,٢٥ جرعة |
| ١٨ | لاسوتا | ماء الشرب بمعدل ١,٢٥ جرعة |
| ٢٢ أو ٢٣ | جمبورو (مثيرة متوسطه) | ماء الشرب بمعدل ١,٢٥ جرعة |
| ٢٢ | لاسوتا | ماء الشرب بمعدل ١,٢٥ جرعة |
| ٤٦ | لاسوتا | ماء الشرب بمعدل ١,٢٥ جرعة |

### البرنامج الوقائى

**الاستقبال : يراعى إضافة الأتى إلى ماء الشرب**

- ٣ ساعات أمن فيدران أو سكتر.
- يستخدم مضاد حيوى معين يختلف مضاد حيوى خاص بالبيكروبلازما ( مثل التايلان ) ويضاف اداهـ و امينوليت .
- من اليوم ٤ : ٦ يوضع هـ : سلنيبود.

- يوضع ادهـ لمدة يومين بعد ان تحصين كم يوضع سلين اسبوع بالتناوب مع امينوليت بمعدل ١ سم ا جرام ، لتر .
- يراعى الالتهابات الرئوية بعد تحصين اللاسوتا واذا حدثت أى اصوات يحظى استخدام الروفوكساسين لمدة ٤ ايام.
- فى اليوم ٢٧ - ٢٩ يضاف مضاد كلوكسيديا.
- يضاف فى اليوم ٢٢ - ٤٥ جرعة مضاد كلوستريديا.

### معدلات التحويل

الأسبوع الأول والثانى يتم فيها تكوين الجهاز العظمى والريش ويحسب معامل التحويل بداية من الأسبوع الثالث كالاتى.

| العمر بالأسبوع | معدلات العلف / كتكوم | متوسط الوزن بالكيلوجرام | معامل التحويل |
|---|---|---|---|
| الأسبوع الثالث | ٠,٦٨٠ | ٠,٥١٥ | ١,٣٢ |
| الأسبوع السرابع | ١,٣٠٠ | ٠,٨٢٥ | ١,٥٧ |
| الأسبوع الخامس | ١,٩٨٠ | ١,١٥٥ | ١,٧٢ |
| الأسبوع السادس | ٢,٨٠٥ | ١,٥٠٠ | ١,٨٧ |
| عمر ٥٠ يوسوم | ٣,٦٦٠ | ١,٨٤٠ | ١,٩٩ |

### تربية دجاج التسمين ساســـو

مميع الكتاكيت المنتجة من أمهات مستوردة من شركة ساسو الفرنسية

**مميزات دجاج التسمين الساسو .**

- متعدد الألوان (الاحمر المشركسى ـ الأحمر ذو البقع السمراء ـ الأسمر ـ الرزى ـ الرزى المشركسى ) .
- المذاق الجلدى الفاخر.
- مقاومة درجات الحرارة المرتفعة نظرا لاتساع الصدر الذى يسمح بالتنفس فى الأوقات الحارة.
- سرعة النمو التى تتساوى مع الدجاج الأبيض.
- المقاومة الشديدة للأمراض وبخاصة CRD.

**الإحتياطات الواجب توافرها .**

- لكى نتجنب الأمراض والحصول على أوزان جيدة يجب مراعاة تربية الدجاج فى نفس العمر فى المزرعة الواحدة.
- عدم السماح بدخول أى فرد من مزارع أخرى أو زوار وتقتصر المزرعة على العاملين بها فقط.
- اذا لزم الأمر دخول افراد أو سيارات أو معدات الى المزرعة يجب اتخاذ اجراءات الأمن الوقائى.
- بعد نقل دورة يجب معالجة العنابر من الداخل والخارج ضد الفيروس والطيور البرية وطفايله لتفادى نقل العدوى.

**التطهير : يجب قبل أى قطيع تطهير العنبر تطهيرا جيدا باتباع الخطوات التالية :**

- ازالة السبلة جيدا مع تكحيت ارضية العنبر باستعمال الشفرة.
- غسل العنبر جيدا بالماء والصابون.
- غسل العنبر بالماء والصوديا الكاوية بتركيز ٢٪.
- تفلق العنبر جيدا ويرش بالماء والفورمالين بتركيز ( ١٠ - ١٢ ٪ ) ولا يتم فتح العنبر الا بعد ٢٤ ساعة من الرش ويترك مفتوحا لمدة ٢٤ ساعة قبل استلام الكتاكيت.
- غسل العنبر بالماء فقط .
- غسل العنبر بالكلور بتركيز ٥ ٪ .
- رش فيركلون أس أو TH4 .
- غسل العنبر بالماء والمنيك بتركيز ٥ ٪ أى باستعمال ٥ لتر لكل ١٠٠ لتر ماء وذلك يتم فى يوم منفصل.

**الإحتياطات الواجب توافرها .**

| العمر بالأيـــــوم | درجة حرارة العنبر |
|---|---|
| ١ - ٣ يوم | ٣٤ - ٣٣ |
| ٤ - ٧ يوم | ٣٣ - ٣١ |
| ٨ - ١٤ يوم (الأسبوع الثانى) | ٣١ - ٢٩ |
| ١٥ - ٢١ يوم (الأسبوع الثالث) | ٢٩ - ٢٦ |
| ٢٢ - ٢٨ يوم (الأسبوع الرابع) | ٢٦ - ٢٣ |
| ٢٩ - ٣٥ يوم (الأسبوع الخامس) | ٢٣ - ٢١ |
| ٣٦ - ٤٢ يوم (الأسبوع السادس) | ٢١ - ١٨ |

| الطريقـــــــة |
|---|
| من عمر ١ - ١٠ يوم بادى تسمين |
| من عمر ٢١ - ٢٦ يوم |
| من عمر ٤٦ حتى الذبح خاص تسمين |

17

COLOURED CHICKEN **XL431L** : breeder male XL44 X recessive hen SA31L - *Standard Feed*

| Age (d.) | Weight (g) | FCR | Male | Female |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 533 | 1,62 | 549 | 517 |
| 28 | 833 | 1,87 | 866 | 799 |
| 35 | 1173 | 2,04 | 1255 | 1091 |
| 42 | 1543 | 2,15 | 1667 | 1420 |
| 49 | 1929 | 2,19 | 2103 | 1756 |
| 56 | 2324 | 2,22 | 2557 | 2092 |
| 63 | 2711 | 2,26 | 2982 | 2440 |
| 70 | 3080 | 2,32 | 3419 | 2741 |
| 77 | 3413 | 2,41 | 3823 | 3003 |
| 84 | 3710 | 2,55 | 4192 | 3227 |
| 91 | 3989 | 2,76 | 4547 | 3431 |

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/POULTRY.DISEASES