

# تغذية الحيوان علمياً وعملياً

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

مركز البحوث الزراعية

مختبر بحوث الانتاج الحيواني

الطبعة الأولى

١٩٩٧

**الاحتياجات الغذائية الموصى عليها للأغنام والماعز**

تبعاً NRC (١٩٨٥) ، IVRI/NDRI (١٩٨١) (كجم / الرأس / اليوم)

فوسفور (كجم) (ج)	كالسيوم (ج) (ج)	صيغة المركبات المهضومة	بروتين خام	مادة جافة	الوزن الحي كجم	حالة الحيوان
٢,٢	٢,٨	٠,٣٠	٠,٠٥٠	٠,٧ - ٠,٥	٢٠	١- نعاج جافة أثناء ١٥ أسبوعاً الأولى من الحمل تزيد بمعدل ٢٥ جم / اليوم
٢,٣	٢,٩	٠,٤٥	٠,٠٦٥	١,٠ - ٠,٨	٢٠	
٢,٤	٣,٠	٠,٥٥	٠,٠٨٥	١,٢ - ١,٠	٤٠	
٢,٥	٣,٢	٠,٦٠	٠,١٠٠	١,٣ - ١,١	٥٠	
٤,٢	٥,٨	٠,٧٠	٠,١٠٥	١,١ - ٠,٩	٢٠	٢- نعاج حوامل أثناء ٦ أسابيع الأخيرة تزيد بمعدل ١٢٠ جم / اليوم
٤,٤	٥,٩	٠,٧٠	٠,١٢٥	١,٤ - ١,٢	٣٠	
٤,٥	٦,٠	٠,٨٥	٠,١٤٥	١,٧ - ١,٤	٤٠	
٤,٦	٦,٢	١,٠٠	٠,١٦٥	١,٨ - ١,٦	٥٠	
٤,٢	٥,٩	٠,٧٠	٠,١٠٠	١,٢ - ٠,٩	٢٠	٣- نعاج حليب أثناء النصف الأول من موسم الحليب وزنها ثابت
٤,٤	٦,١	٠,٩٠	٠,١٢٠	١,٥ - ١,٣	٣٠	
٤,٦	٦,٢	١,١٠	١,٥٠	١,٨ - ١,٦	٤٠	
٤,٨	٦,٥	١,١٥	٠,١٧٥	٢,١ - ١,٩	٥٠	
٣,١	٤,٢	٠,٧٠	٠,٠٩٥	١,١ - ٠,٩	٢٠	٤- نعاج حليب أثناء النصف الثاني من موسم الحليب تزيد بمعدل ٢٥ جم / اليوم
٣,٢	٤,٣	٠,٧٠	٠,١٢٥	١,٤ - ١,٢	٣٠	
٣,٣	٤,٤	٠,٨٠	٠,١٣٥	١,٦ - ١,٤	٤٠	
٣,٤	٤,٦	٠,٩٠	٠,١٤٥	١,٨ - ١,٦	٥٠	
٢,٥	٢,٩	٠,٣٠	٠,٠٧٠	٠,٥ - ٠,٣	١٠	٥- حملان نامية تزيد بمعدل ١٢٠ جم / اليوم - ٨٠ جم / اليوم
٢,٥	٢,٩	٠,٤٥	٠,٠٨٥	٠,٧ - ٠,٥	٢٠	
٢,٦	٢,٠	٠,٦٥	٠,١١٥	١,١ - ٠,٩	٣٠	
٢,٧	٢,٠	٠,٨٥	٠,١٤٠	١,٣ - ١,١	٤٠	
٢,٤	٢,٦	٠,٤٠	٠,٠٩٥	٠,٨ - ٠,٦	١٠	٦- حملان تسنين تزيد بمعدل ١٥٠ جم / اليوم - ١٢٠ جم / اليوم
٢,٦	٢,٩	٠,٥٥	٠,١٢٥	١,١ - ٠,٩	٢٠	
٢,٧	٢,٠	٠,٨	٠,١٤٥	١,٤ - ١,٢	٣٠	
٢,٧	٢,٠	٠,١٠	٠,١٨٠	١,٨ - ١,٦	٤٠	

# مقررات العلائق للأغنام والماعز

## (كجم / الرأس / اليوم)

علائق صيفية				علائق شتوية			الوزن الحى كجم	حالة الحيوان
مركز	تبن	دريس	مركز	تبن	برسيم			
١-٠	٥٠	٢٥	-	٢٥	٢	٢	١- نعاج جافة أثناء ١٥ أسبوعاً الأولى من الحمل تزيد بمعدل ٢٥ جم / اليوم	١- نعاج جافة أثناء ١٥ أسبوعاً الأولى من الحمل تزيد بمعدل ٢٥ جم / اليوم
٢-٠	٥٠	٢٥	٣٠	٢٥	٢	٢		
٣-٠	٥٠	٢٥	٣٠	٥٠	٢	٤		
٤-٠	٥٠	٢٥	٤٠	٥٠	٢	٥		
٥-٣٥	٥٠	٣٠	٣٠	٢٥	٢	٢	٢- نعاج حوامل أثناء ٦ أسابيع الأخيرة تزيد بمعدل ١٢٠ جم / اليوم	٢- نعاج حوامل أثناء ٦ أسابيع الأخيرة تزيد بمعدل ١٢٠ جم / اليوم
٥٥	٥٠	٣٠	٥٠	٢٥	٢	٣		
٦٥	٦٠	٣٠	٦٠	٥٠	٢	٤		
٩٠	٦٠	٣٠	٧٥	٥٠	٢	٥		
٥-٥	٥٠	٣٠	٤٠	٢٥	٤	٢	٣- نعاج حليب أثناء النصف الأول من موسم الحليب وزنها ثابت	٣- نعاج حليب أثناء النصف الأول من موسم الحليب وزنها ثابت
٨	٥٠	٣٠	٦٥	٢٥	٤	٣		
١١	٦٠	٣٠	٦٥	٥٠	٥	٤		
١٢	٦٠	٣٠	٧٥	٥٠	٥	٥		
٥-٣٥	٥٠	٣٠	٢٠	٢٥	٤	٢	٤- نعاج حليب أثناء النصف الثاني من موسم الحليب تزيد بمعدل ٢٥ جم / اليوم	٤- نعاج حليب أثناء النصف الثاني من موسم الحليب تزيد بمعدل ٢٥ جم / اليوم
٥٥	٥٠	٣٠	٢٠	٥٠	٤	٣		
٦٥	٥٠	٣٠	٢٥	٥٠	٥	٤		
٩٠	٦٠	٣٠	٤٥	٥٠	٥	٥		
٢٥	-	٢٥	٢٥	-	١٥	١٠	٥- حملان نامية تزيد بمعدل ١٢٠ جم / اليوم	٥- حملان نامية تزيد بمعدل ١٢٠ جم / اليوم
٤٠	١٥	٢٥	٤٥	٢٥	١	٢٠		
٤٥	٥٠	٢٥	٦٠	٢٥	١٥	٣٠		
٩٠	٢٥	٢٥	٩٠	٢٥	١٥	٤٠		
٣٠	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢	١٠	٦- حملان تسمين تزيد بمعدل ١٢٠ جم / اليوم	٦- حملان تسمين تزيد بمعدل ١٢٠ جم / اليوم
٥٥	٢٥	٤٥	٤٥	٢٥	٢	٢٠		
٧٠	٥٠	٢٥	٥٠	٥٠	٢	٣٠		
٩٥	٥٠	٥٠	٩٥	٥٠	٢	٤٠		

• احتياجات غذائية ومقرراتٍ علائق للأغنام والماعز، المصدر: كتاب "تغذية الحيوان علمياً وعملياً"، معهد بحوث الإنتاج الحيواني، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة، مصر، الطبعة الأولى، ٢٠٠٧، ص ٣٠٠ - ٣٠١.



مع خالص تحياتي  
محمود سلامة الهايشة

*Mahmoud Salama El-Haysha*

[elhaisha@gmail.com](mailto:elhaisha@gmail.com)