

دليل أمراض الدواجن شركة سيفا - شرح وتعليق د/السيد صبحي

بسم الله الرحمن الرحيم

الأمراض البكتيرية التي تصيب الدواجن

رابعاً :- الريملا RIEMERELLA ANATIPESTIFER

التعريف :- مرض بكتيري يصيب الطيور المائية كالبط والأوز، وتكون الإصابة في الأعمار الصغيرة من ٢ - ٨ أسبوع ، وفوق ٢٠ أسبوع تصبح الطيور لديها مقاومة طبيعية ، وتعتبر الريملا من الأمراض التي تسبب تسمم دموي.

المسبب :-

بكتيريا الريملا أنتي بستفير
Riemerella anatipestifer

فترة الحضانة :-

تتراوح بين ١٢ - ٤٨ ساعة . .

الوقاية :-

الإهتمام بالأمن الحيوي في المزرعة ، ضبط التهوية السليمة ، عدم تربية طيور مختلفة في نفس المزرعة

التحصين :- لقاح ميت يحقن تحت الجلد في عمر أسبوع وهو يحمي لمدة ٨ أسابيع أي فترة المرض

العلاج :-

- إعطاء مركبات السلفا (رقم واحد في العلاج) مثل السلفاديميدين أو السلفا كينوكسولين في مياه الشرب لمدة ٥ أيام

- إعطاء المُضادات الحيوية مثل الكولستين، الفلموكين والكلورتتراسيكلين ، واللينكوميسين أو اسبكتينومايسين، أو الفلوريكول أو الأموكسيسيلين لمدة ٥ أيام.

RIEMERELLA ANATIPESTIFER INFECTIONS

(أعراض تنفسية)

(اسهال أصفر مخضر في البط)

(أعراض عصبية في الرأس والرقبة)



82. Riemerella anatipestifer (RA) infection is a contagious disease in domestic ducks, turkeys and other fowl. It is encountered as acute or chronic septicaemia and is characterized with serous fibrinous polyserosites.

The respiratory tract could be also affected. The ducklings at the age of 18 weeks are especially susceptible. Clinically, sneezing, cough, trembling of the head and neck, ataxia and greenish diarrhoea could be

present.

(ترسب المواد الفبرينية على القلب والاكياس الهوائية والجلد)



83. The most characteristic gross lesion is the deposit of fibrinous exudate on the pericardium, the liver capsule or air sacs. The chronic lesions affect the skin and the joints. Although a tentative diagnosis could be made on the basis of observed clinical symptoms and lesions, it is confirmed upon the isolation and identification of RA.

The RA infection should be distinguished from septicaemiae due to *P. multocida*, *E. coli*, *Salmonella* etc. The treatment with antibiotics (Flumequine) and sulfonamides (Trimetoprim, Sulfadiazine) has a varying success.

المصدر :- دليل أمراض الدواجن شركة سيفنا
(جروب أمراض الدواجن وكيفية الوقاية منها)

الشرح والتعليق :- د/السيد صبحى موسى

طبيب أمراض الدواجن والأرانب

<https://www.facebook.com/groups/Poultry.Diseases/>